

CONDUCIR UN VEHÍCULO O CAMINAR PUEDEN VERSE AFECTADOS POR UN CONSUMO NO RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS.

El consumo continuo o eventual de medicamentos mejora la calidad de vida, siempre que se realice bajo control médico o farmacéutico.



Infórmese, en el interior, de los efectos adversos que puede producir la ingestión descontrolada de medicamentos en su seguridad vial.



www.educacionvial.dgt.es

CONSEJOS GENERALES



No tome medicamentos por decisión propia. Consulte siempre a su médico o farmacéutico.



Tome la dosis que le indique su médico. No todas las personas necesitan la misma dosis.



Recuerde que ingerir más de un medicamento puede facilitar la aparición de efectos adversos.



Tenga precaución al comenzar un tratamiento o al cambiar de dosis.



Lea siempre el prospecto. Ante cualquier síntoma o anomalía, consulte a su médico o farmacéutico.



© MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
Área de Educación y Divulgación
Josefa Valcarcel, 28
28027 Madrid



G L O S A R I O

- **Ataxia y alteraciones de la coordinación:** Incapacidad del sistema nervioso de coordinar movimientos musculares para conducir o caminar.
- **Autoprescripción:** Consumir medicamentos sin prescripción médica y sin consejo farmacéutico.
- **Discinesia:** Incoordinación de movimientos voluntarios o aparición de movimientos involuntarios por efecto de una enfermedad o consumo de un medicamento.
- **Disminución de los reflejos y de la atención:** Lentitud en la respuesta del cuerpo a las necesidades de la conducción o de la vía.
- **Efecto de la edad:** Reducción o aumento descontrolado de la eficacia de los medicamentos debidos a la edad. Aparición de efectos perjudiciales por el consumo de varios medicamentos. Las dosis deben ser adaptadas a la edad del paciente.
- **Efectos anticolinérgicos:** Sequedad de boca, visión borrosa y delirio.
- **Hipoglucemia:** Descenso de la glucosa en sangre que origina mareo, sudor, temblor, dolor de cabeza, visión doble y que puede desencadenar convulsiones y pérdida de conciencia.
- **Interacción de medicamentos:** Alteración de los efectos de un fármaco por la administración de otro, por alimentos o por alcohol.
- **Mareo y vértigos:** Sensación de inestabilidad y movimiento del cuerpo, o de los objetos que nos rodean.
- **Polifarmacia:** Ingestión de varios medicamentos a la vez, que incrementa las posibilidades de efectos indeseables.
- **Sedación:** Reducción de la capacidad de atención y respuesta del organismo.
- **Temblor:** Movimientos involuntarios alternantes que afectan a cualquier parte del cuerpo, dificultando la conducción o la marcha.
- **Visión borrosa:** Incapacidad para enfocar imágenes en nuestra retina.

¿CONOCE LOS EFECTOS DE SU MEDICACIÓN?

...SOBRE LA SEGURIDAD VIAL

...Y CON ALCOHOL

SI ESTÁ EN TRATAMIENTO PARA...

		SUEÑO 	EUFORIA 	MAREO 	HIPOTENSIÓN 	VISION BORROSA 	OTROS EFECTOS 	MAYOR SEDACIÓN 	EFECTOS INDESEABLES 	EFECTOS MUY INDESEABLES
LOS DOLORES	<ul style="list-style-type: none"> ANALGÉSICOS <i>Analgésicos narcóticos*</i> 									
DORMIR Y PARA LOS NERVIOS	<ul style="list-style-type: none"> ANSIOLÍTICOS E HIPNÓTICOS• 						Alteraciones de la coordinación			
	<ul style="list-style-type: none"> ANTIDEPRESIVOS• 						Fatiga			
	<ul style="list-style-type: none"> ANTISICÓTICOS• 						Discinesia			
	<ul style="list-style-type: none"> PSICOESTIMULANTES 						Nerviosismo Temblor			
LA DIABETES	<ul style="list-style-type: none"> ANTIDIABÉTICOS 						Hipoglucemia			 Clorpropamida
LOS RESFRIADOS, LA TOS Y LOS BRONQUIOS	<ul style="list-style-type: none"> ANTITUSÍGENOS 									
	<ul style="list-style-type: none"> ANTIHIISTAMÍNICOS* 						Ansiedad Insomnio			
	<ul style="list-style-type: none"> ANTIINFECCIOSOS 									Algunos
LA CIRCULACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES 									
LA CIRCULACIÓN Y LA TENSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> VASODILADORES Y ANTIHIPERTENSIVOS 									
OTROS	<ul style="list-style-type: none"> ANTICOLINÉRGICOS 						Confusión			
	<ul style="list-style-type: none"> ANTICONVULSIVANTES• 						Ataxia			
	<ul style="list-style-type: none"> ANTIPARKINSONIANOS• 						Confusión Reducción de reflejos			

* En algunos se desaconseja la conducción durante el tratamiento
 • En algunos se desaconseja la conducción al comienzo del tratamiento o tras el cambio de dosis